

LISTE DE CONTROLE DE VACCINATIONS POUR VISA AMERICAIN

NOM

DATE DE NAISSANCE

A l'attention du médecin généraliste : Vérifier la présence du nom et la date de naissance ; mettre à jour les vaccinations et les enregistrer dans la colonne de droite avec la date indiquée ; signer et tamponner chacun.

		NOM DU VACCIN, DATE DE VACCINATION, SIGNATURE ET TAMPON
Diphtérie, tétanos, coqueluche et polio	À faire les 4 si pas de rappel pendant 10 ans (par exemple REPEVAX) Cas particulier POLIO - vous devez avoir eu un rappel de vaccination contre la poliomyélite dans les 4 à 52 dernières semaines si vous résidez ou avez passé plus de 4 semaines dans certains pays désignés à haut risque. Vous devez consulter la liste de tous les pays actuellement touchés sur la page web du CDC	
Hépatite B	Si en dessous de 60 ans. 3 doses – le deuxième à J+1 mois et troisième à J+6 mois. Au moins un vaccin avant la visite	
Rubéole, oreillons, rougeole (ROR)	A faire si vous êtes né à partir de 1957. Au moins 1 avant la visite. Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé contre les 3 maladies. Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, vous devriez être vacciné à nouveau avec le ROR. Les vaccins individuels n'existent pas. Des antécédents de rubéole, d'oreillons, de rougeole ne suffisent pas comme preuve. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Varicelle	Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. Demandez une ordonnance à votre médecin. Des antécédents de varicelle ne suffiront que si vous avez la date notée par un médecin. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Grippe saisonnière	Le vaccin est obligatoire pendant la saison grippale (début octobre à fin janvier, tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies). Vérifiez la disponibilité chez votre pharmacien.	
Pneumocoque	Le vaccin antipneumococcique est obligatoire à partir de 65 ans . Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis appellent à une première vaccination avec le vaccin antipneumococcique PN 20	